

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Гербион® сироп первоцвета**

**Herbion® cowslip syrup**

---

наименование лекарственного препарата

**сироп**

---

лекарственная форма, дозировка

**АО «КРКА, д.д., Ново место», Словения**

---

наименование производителя, страна

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Гербион® сироп первоцвета

**Лекарственная форма:** сироп

**Состав**

5 мл сиропа содержит:

Активные вещества:

\* Первоцвета весеннего корней экстракт жидкий (1 : 2 - 4,6) 1,03 г

\*\* Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий (1 : 3,3) 2,06 г

**Вспомогательные вещества:**

Левоментол, метилпарагидроксибензоат (E218), сахароза

\* Первоцвета весеннего корней экстракт жидкий (1 : 2 - 4,6) приготовлен из:

Первоцвета корни (*Primula veris* L., f. *Primulaceae*), вода очищенная (экстрагент)

Соотношение (1 : 2 - 4,6) соответствует соотношению лекарственного растительного сырья : экстракту; (в среднем из 1 части растительного сырья получают 3,3 части экстракта).

\*\* Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий (1 : 3,3) приготовлен из:

Тимьяна трава (*Thymus vulgaris* L., f. *Lamiaceae*), вода очищенная (экстрагент)

Соотношение (1 : 3,3) соответствует соотношению лекарственного растительного сырья : экстракту; (из 1 части растительного сырья получают 3,3 части экстракта).

## **Описание**

Сироп коричневого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие опалесценции.

**Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающее средство растительного происхождения

**Код АТХ:** R05CA10

## **Фармакологические свойства**

Препарат обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным действием; способствует уменьшению вязкости мокроты и лучшему ее отхождению.

## **Показания к применению**

Препарат применяется в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит, трахеобронхит).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к препаратам, содержащим активные вещества семейства первоцветные и семейства яснотковые; дети после перенесенного острого обструктивного ларингита (круп); бронхиальная астма, сахарный диабет; наследственная непереносимость фруктозы; синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы и врожденная недостаточность сахаразы-изомальтазы; детский возраст до 2-х лет.

## **Беременность и период лактации**

Беременным и кормящим женщинам принимать препарат не рекомендуется (в связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата у указанной группы пациентов).

## **Способ применения и дозы**

Внутрь, препарат рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством теплой воды.

Перед употреблением взбалтывать!

Взрослым рекомендуется принимать по 3 мерные ложки (1 мерная ложка - 5 мл) 3-4 раза в сутки после еды.

Детям в возрасте от 2 до 5 лет - по 1/2 мерной ложки 3 раза в сутки после еды.

Детям в возрасте от 5 до 14 лет – по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки после еды.

Детям старше 14 лет – по 2 мерных ложки (10 мл) сиропа 3-4 раза в сутки.

Длительность курса терапии - 2-3 недели. Увеличение длительности или проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

## **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. Возможны в очень редких случаях: тошнота, рвота, диарея. В случае появления побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Передозировка**

Сообщений о случаях передозировки препарата не поступало.

В случае передозировки сапонинсодержащих препаратов, возможны желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся тошнотой, рвотой, диареей.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Гербион® сироп первоцвета не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Особые указания**

В 1 мерной ложке сиропа (5 мл) содержится 3,16 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций по применению препарата, указанных в инструкции, пациент получает на прием от 3,16 г (1 мерная ложка – 5 мл, что соответствует 0,316 хлебным единицам) до 9,48 г (3 мерных ложки – 15 мл, что соответствует 0,948 хлебным единицам) сахарозы.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами: препарат Гербион® сироп первоцвета не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с другими сложными техническими устройствами, требующую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Сироп.

По 150 мл сиропа во флаконе темного стекла (тип III), укупоренного пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. 1 флакон помещен в пачку картонную вместе с дозирующей пластиковой ложкой и инструкцией по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Не хранить в холодильнике. Хранить в недоступном для детей месте

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта

### **Наименование и адрес держателя или владельца регистрационного удостоверения**

АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

### **Производство готовой лекарственной формы**

АО «КРКА, д.д., Ново место», Повхова улица 5, 8501 Ново место, Словения

### **Первичная упаковка**

АО «КРКА, д.д., Ново место», Повхова улица 5, 8501 Ново место, Словения

### **Вторичная/потребительская упаковка**

АО «КРКА, д.д., Ново место», Повхова улица 5, 8501 Ново место, Словения

### **Производитель (Выпускающий контроль качества)**

АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

### **Представительство АО «КРКА, д.д., Ново место» в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей:**

125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1  
Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91